

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА

БРУЦЕЛЛЕЗ –

это инфекционно-аллергическое заболевание, общее для человека и животных. Человеку передается от больных животных.



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ:

- Овцы;
- Козы;
- Крупный рогатый скот;
- Свины;
- Реже - другие животные, в том числе дикие.



ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИИ:

БАКТЕРИИ БРУЦЕЛЛЫ

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

- **контактный путь** - при контакте с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения;
- **пищевой путь** - при употреблении молочных продуктов и мяса, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших достаточную термическую обработку;
- **аэрозольный путь** - при вдыхании воздушно-пылевой смеси, содержащей контаминированные бруцеллами фрагменты шерсти, навоза, земли, подстилки.

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.



Инкубационный период от 1 недели до 2-х месяцев. В начале заболевания отмечаются подъемы температуры до 39-40°C (чаще в вечерние и ночные часы). Симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа: лихорадка, боли в спине, ломота в теле, плохой аппетит, потеря веса, слабость, головная боль, ночная потливость, кашель, боль в животе.

Для предупреждения заболевания бруцеллезом необходимо выполнять следующие рекомендации:

не приобретать мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты в местах неуставленной торговли;

молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частных лиц, употреблять только после тщательной термической обработки;

соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота;

информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания животных с подозрением на бруцеллез (аборт, рождение нежизнеспособного молодняка);

при непосредственном уходе за животными, а также при уборке соломы, навоза, земли, подстилки, с которыми контактировали животные, соблюдать меры личной профилактики, в т.ч. использовать средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маска либо респиратор и рукавицы).