

Профилактика гепатитов!

Гепатит – воспалительное заболевание печени, как правило, вирусного происхождения.

Основные пять вирусов гепатита (А, В, С, Д и Е) отличаются друг от друга, передаются разными путями, затрагивают разные группы населения и приводят к разным последствиям для здоровья.

Источниками вирусной инфекции выступают лица больные острой или хронической формой заболевания, вирусоносители. Многие инфицированные не подозревают об имеющемся заболевании или вирусоносительстве, не обращаются за медицинской помощью и могут стать причиной заражения других людей.

Заразиться гепатитом В или С можно в результате нарушения правил безопасности:

- при проведения процедур и манипуляций, сопровождавшихся нарушением целостность кожи (инъекции, маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж, шрамирование и др.), в том числе проводимых в домашних условиях с использованием нестерильного инструментария.
- при незащищенных, (без использования презерватива) половых контактах.
- при частой смене половых партнеров, или при половых контактах с инфицированным партнером.
- при бытовых контактах, если инфицирован кто-то из членов семьи. Опасность представляют только те предметы, на которых может содержаться кровь: бритвенные принадлежности, маникюрные принадлежности, зубная щетка, расческа, мочалка, полотенце. Для каждого из членов семьи эти предметы гигиены должны быть индивидуальными.

Государственное учреждение Ивановский районный ЦГиЭ

Министерство Здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение Ивановский районный ЦГиЭ

Где мы можем заразиться гепатитом?

Наиболее распространенным путем проникновения вируса считается контакт с кровью больного. Люди с гепатитом посещают стоматологические кабинеты, делают маникюр и татуировки, обращаются за медицинской помощью с проведением многих видов медицинских манипуляций. В том случае, если специалистом не будет проведена обработка инструмента после больного, повысится риск распространения инфекции среди других людей.

Заболевание передается половым путем, а также плоду от матери внутриутробно и через молоко при кормлении.

Выделяют и контактно-бытовой путь передачи вируса. Высокий риск инфицирования выделяют в случае совместного пользования предметов личной гигиены, которые принадлежат человеку с гепатитом, а также при соприкосновении с любыми поверхностями помещений и предметов, загрязненными кровью, содержащей вирусы гепатита (при наличии на коже порезов или микротравм). При этом вирусы не передаются при разговоре, чихании, со слюной, а также при рукопожатии, объятиях, пользовании общей посудой, едой и напитками.

Основным путем распространения инфекции у людей, практикующих инъекционное введение наркотиков, считается применение одного шприца.

