


ПТИЧИЙ ГРИПП:



защита - профилактика!

ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С БОЛЬНОЙ ПТИЦЕЙ (ПРИ ЗАБОЕ, ОБЩИПКЕ ПЕРЬЕВ, ПОТРОШЕНИИ) И ПАВШЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ВДЫХАНИИ ВИРУСА С ПЫЛЬЮ И КОНТАКТЕ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ЕЕ ФЕКАЛИЯМИ И СЛЮНОЙ.



Признаки птичьего гриппа у человека схожи с гриппозными симптомами. В отдельных случаях инфекция может проявляться в виде вирусного конъюнктивита.

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РАЗДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ В ПИЩУ СЛЕДУЕТ:

- ★ переносить купленные сырые тушки и субпродукты из кур в отдельном пакете;
- ★ не резать сырое и готовое мясо одним и тем же ножом;
- ★ после разделки сырого, в т.ч. размороженного мяса, субпродуктов из кур вымыть руки и все рабочие поверхности мыльным раствором из хозяйственного мыла;
- ★ не хранить сырое мясо и субпродукты из птицы вместе с уже приготовленным;
- ★ подвергать мясо и субпродукты термической обработке не ниже 70°C (готовое блюдо из птицы не должно быть розовым и выделять розовый сок);
- ★ не употреблять сырые или недоваренные яйца (яичный желток не должен быть жидким); перед приготовлением яйца следует обязательно вымыть мыльным раствором из хозяйственного мыла;
- ★ не приобретать птицу и яйца у неизвестных лиц и в не установленных местах.

В ЦЕЛЯХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЮДЯМ, КОНТАКТИРОВАВШИМ С БОЛЬНОЙ И ПАВШЕЙ ПТИЦЕЙ, НЕОБХОДИМО:

- ✓ промыть носовые ходы раствором мыла (желательно хозяйственного) и смазать оксолиновой мазью;
- ✓ срочно принять один из препаратов - «Ремантадин», «Арбидол» или «Интерферон»;
- ✓ в течение 7 дней измерять температуру;
- ✓ при появлении симптомов ОРЗ или заболеваний глаз немедленно обратиться к врачу.

При возникших вопросах обращайтесь в центры гигиены и эпидемиологии.

Контактные телефоны в г. Бресте:

8 (0162) 53 23 44

8 (0162) 53 23 46

ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 2023 г.